

KOTIHOITO-OHJEITA KITARISALEIKKAUKSEN JÄLKEEN

Leikkauspäivänä lapsen olisi levättävä mahdollisimman paljon jälkivuotojen välttämiseksi. Leikkauksen aikana ja sen jälkeen lapsen vatsaan valuu hieman verta, joka poistuu oksennuksena. Tämä ei ole vaarallista. Kylmät juomat yleensä rauhoittavat vatsaa.

Suosittelavaa ravintoa ovat jäätelö sekä kylmät tai haaleat vellit ja kiisselit. Leikkausta seuraavasta päivästä alkaen lapselle saa antaa normaalia ravintoa.

Antakaa lapselle leikkauksen jälkeiseen kipuun tarpeen mukaan tavanomaista kuume- ja särkylääkettä (esim. Pronaxen, Panadol)

1-3 päivänä leikkauksen jälkeen lapsen olisi pysyteltävä sisätiloissa. Neljäntenä leikkauksen jälkeisenä päivänä lapsi voi mennä päivähoitoon/ kouluun.

Viikon ajan leikkauksen jälkeen saunominen ja kuuma kylpy eivät ole suotavia.

Leikkauksen jälkitarkastus ei ole välttämätön, ellei toisin sovita hoitaneen lääkärin kanssa.

Leikkaavaan lääkäriin, sairaalaan tai paikalliseen terveyskeskukseen on syytä ottaa yhteyttä, mikäli leikkausalueella ilmenee jatkuvaa verenvuotoa tai muita hälyttäviä oireita.

Lääkäriin: _____ puh: _____

HYVÄÄ TOIPILASAIKAA!