

JÄLKIHOITO-OHJE SUUSSA SUORITETUN LEIKKAUKSEN JÄLKEEN

Jätä haava rauhaan. Vältä koskettelua sormilla, syljeskelyä tai haavan imeskelyä.

Vältä ruokailua, kunnes puudutus on mennyt ohi. Tämän jälkeen on vältettävä liian kuumaa ruokaa sekä aineita, jotka saattavat aiheuttaa jälkivuotoa (esim. kahvi, voimakkaasti maustetut, tuliset ruuat).

Vähäistä jälkivuotoa saattaa esiintyä ensimmäisen vuorokauden aikana. Suuta voi purskutella haalealla vedellä.

Kipua ja turvotusta voi esiintyä etenkin kahtena ensimmäisenä päivänä toimenpiteen jälkeen. Reseptivapaat särkylääkkeet yleensä riittävät kivun hoitoon. Älkää käytäkö ASPIRIN/DISPERIN lääkkeitä ja noudattakaa lääkärin antamia ohjeita lääkkeiden annostelussa.

Ota yhteyttä jos:

- haavassa ilmenee yllättävää kipua
- haava vuotaa edelleen verta, turpoaa tai alkaa märkiä
- jos 38 asteen kuume kestää yli vuorokauden

Hoitava lääkäri: _____ Puh. _____

HYVÄÄ TOIPILASAIKAA !